



수클리어® 1L

# 대장내시경 검사 안내문

정확한 대장내시경 검사를 위해 아래와 같은 주의사항을 꼭 지켜 주셔야 합니다.

\_\_\_\_\_ 님의 검사 시간은  
\_\_\_\_\_ 월 \_\_\_\_\_ 일 \_\_\_\_\_ 시 \_\_\_\_\_ 분입니다.

## 검사 전 준비사항


대장내시경 검사 3일 전부터 씨있는 과일 (수박, 감, 포도, 키위, 메론, 참외 등), 해조류 (미역줄기), 곡물 (현미, 잡곡, 깨, 콩, 옥수수 등), 채소 (질긴 나물, 열무김치, 고사리, 시레기 등)은 드시지 마십시오. 내시경 검사 전 날 아침, 점심식사는 반찬없이 흰 죽만 드십시오. 저녁은 금식하십시오.

## 복용법

### 첫번째 병 ▶

- 전날  당일
- 오전  오후

\_\_\_\_\_ 일  
\_\_\_\_\_ 시 \_\_\_\_\_ 분




수클리어® 한 병을 계량컵에 붓습니다.



계량컵 표시선까지 차가운 물을 넣고 균일하게 섞습니다.



혼합된 용액을 모두 마십니다.




복용 후 표시선까지 물을 채워 두 차례 이상 충분히 마십니다.

### 두번째 병 ▶

- 전날  당일
- 오전  오후

\_\_\_\_\_ 일  
\_\_\_\_\_ 시 \_\_\_\_\_ 분




수클리어® 한 병을 계량컵에 붓습니다.



계량컵 표시선까지 차가운 물을 넣고 균일하게 섞습니다.



혼합된 용액을 모두 마십니다.



복용 후 표시선까지 물을 채워 두 차례 이상 충분히 마십니다.

\*충분한 물 복용은 깨끗한 장정결에 도움을 줍니다.

## 복용시 주의사항

- 심장질환이나 신장질환, 당뇨로 약물 치료나 인슐린 주사를 맞고 계시는 분은 사전에 상담 바랍니다.
- 아스피린, 와파린(쿠마딘), 티클로피딘, 클로피도그렐, 디피리다몰, 프레탈 등을 복용하시는 경우에는 검사 전 1주일 정도 복용을 중단하시는 것이 좋습니다.
- 대장정결제 복용이 어려울 수 있으나 장 정결상태가 불량할 시에는 검사가 제대로 진행되지 못할수도 있으므로 안내 받으신대로 모두 복용하셔야 검사가 가능합니다.